

Сравнительная характеристика заболеваний ОДА

Признак	Ревматизм	Ревматоидный артрит	Деформирующий остеоартроз	Подагра
1. Преобладающий возраст больных	7-15	30-50	55-65	30-40
2. Пол больных	Чаще женщины	Чаще женщины	Любой	Почти исключительно мужчины
3. Локализация процесса в начале болезни	Коленные, локтевые суставы	Чаще II-III пястно-фаланговые суставы, симметрично	Коленные, тазобедренные, голеностопные суставы, межфаланговые суставы костей	I-шесте-фаланговый сустав первого пальца стопы
4. Характер поражения	Летучие, менее 2-х недель, без остаточных явлений	Волнообразные, с остаточными явлениями	Хронические	Приступообразные
5. Утренняя скованность	Нет	Выражена	Как правило, нет	Нет
6. Вечерние и ночные боли	Есть	Есть	Боли усиливаются к вечеру, после физ. нагрузок	Нет
7. Деформации и анкилозы	Не бывает	Типичные, выраженные	Умеренные	Могут быть
8. Нарушение функций суставов	Приходящее	Прогрессирующее	Умеренное	Выраженное
9. Лихорадка	Высокая при обострении	Субфебрильная при обострении	Норма	До 38°C в приступе
10. Лейкоцитоз	++	+	-	+ (во время приступа)
11. Увеличение СОЭ	++	++	-	+
12. Ревматические пробы	+++	++	-	-
13. Ревматоидный фактор	-	+++	-	-
14. С-реактивный белок	+++	++	-	-
15. Уровень мочевой кислоты в крови	Норма	Норма	Норма	Повышен (более 0,413 ммоль/л)
16. Прочие признаки	Начало и рецидивы артрита связаны с очаговой инфекцией (ангина и др.), как правило, формируется порок сердца.	Ревматоидные подкожные узелки.	Как правило, сопутствуют ожирение, варикоз, нарушение статики, обострения после физ. нагрузки, метеопатия.	Наследственная отягощенность, злоупотребление алкоголем, мясными продуктами, тофусы в зоне суставов, ушных раковин.

Примечание: (+) и (-) обозначают степень выраженности признака: (+) – слабая; (++) – умеренная; (+++) – сильная; (+-) – признак может отсутствовать.