

ТАБЛИЦА Наиболее часто применяемых видов инсулинов.

Вид инсулина	Начало действия	Пик действия	Продолжительность действия
Инсулины Ультракороткого Действия /аналоги Инсулина человека			
*Хумалог /Humalog/ *Новорапид/NovoRapid/	0 – 15 мин	1 – 1,5 час	4 – 5 час
Инсулины короткого действия			
*Актрапид НМ /Actrapid HM / * Апидра *Хумулин Регуляр /Humulin R / *Инсуман Рапид /Insuman Rapid /	30 – 45 мин	2 – 4 час	6 – 8 час
Инсулины средней Продолжительности действия			
*Хумулин НПХ /Humuline NPH / *Протафан НМ /Protaphane HM / *Инсуман Базал /Insuman Basal /	1 -3 час	6 – 8 час	10 – 14 час
Инсулины Длительного Действия /аналоги Инсулина человека/			
*Левемир /Levemir/ *Лантус /Lantus/	1 час 1,5 час	Не выражен нет	17 – 20 час Около 24 час

Дозу инсулина и схему его введения подбирает врач. При лечении инсулином исходят из того, чтобы его концентрация была близка физиологическому ритму его секреции у здоровых людей. При этом максимальное действие инсулина должно совпадать по времени с пиком уровня сахара после еды.