

недостающие.

1. почему крайне важно вскармливать новорожденного молозивом:

- а. содержит большое кол-во белков, вит. И мин. В-в
- б. содержит защитные факторы
- в. подготовливает кишечник к перевариванию зрелого молока
- г. все перечисленное верно

2. преимущество грудного молока перед коровьим:

- а. высокое содержание белка
 - б. высокое содержание витаминов
 - в. высокая калорийность
 - г. оптимальное соотношение пищевых вещ-
- 3. первое прикладывание здорового новорожденного к груди матери проводят:**

- а. сразу после рождения
 - б. через 6 часов
 - в. через 12 часов
 - г. через 24 часа
- 4. какова длительность кормления грудью новорожденного:**

- а. не имеет значения
- б. 5-10 мин
- в. 20-30 мин
- г. по требованию

5. ночной перерыв между кормлениями необязателен для ребенка (мес):

- а. 1 мес.
- б. 3 мес.
- в. 6 мес.
- г. 9 мес.

6. контроль кормления ребенка проводят для определения:

- а. массы тела
- б. кол-во высосанного молока
- в. кол-во прикорма
- г. кол-во докорма

7. выработка молока молочной железой происходит под влиянием гормона:

- а. окситоцином
- б. прогестерона
- в. пролактина

8. выделение молока происходит под влиянием гормона:

- а. окситоцина
- б. прогестерона
- в. пролактина

9. в первые три дня из груди родильницы выделяется

10. переходное молоко появляется на день и затем появляется

11. первый раз ребенка прикладывают к груди:

- а. сразу после родов
- б. по желанию матери
- в. зависит от состояния матери

12. для поддержания лактации у родильницы следует:

- а. не ограничивать частоту и продолжительность кормления

б. г. е.

в. д.

13. затруднением при вскармливании грудью со стороны матери могут быть:

- а. недостаточное кол-во молока

б. в.

14. затруднением при вскармливании ребенка грудью со стороны ребенка могут быть:

- а. б. в.

15. при правильной технике кормления грудью ребенок:

- а. захватывает сосок матери

б. захватывает сосок и околососковый кружок, больше снизу

в. сосет с жадностью, захлебываясь и раздувая щеки

16. суточный объем молока для детей первых 10 мес. жизни не превышает (л.):

- а. 0,5
- б. 1,0
- в. 1,5
- г. 2,0

17. дети нуждаются в дополнительном введении водорастворимых витаминов с возраста (мес.):

- а. 2,5
- б. 3
- в. 4
- г. 5

18. для удовлетворения потребности ребенка в жирорастворимых витаминах ему дают яичный желток с возраста (мес.):

- а. 2 мес. б. 4 мес. в. 6 мес. г. 8 мес.

19. творог вводится в рацион грудного ребенка с возраста (мес.):

- а. 4 мес. б. 5 мес. в. 6 мес. г. 10 мес.

20. фруктовые соки дают ребенку грудного возраста:

- а. перед кормлением грудью б. после кормления грудью
в. между кормлениями грудью г. только на ночь

21. фруктовые соки и яблочное пюре вводят в рацион грудного ребенка для обеспечения его:

- а. белками б. жирами
в. водорастворимыми витаминами г. жирорастворимыми витаминами

22. яичный желток дают ребенку грудного возраста для обеспечения его :

- а. белками б. углеводами

- в. водорастворимыми витаминами г. жирорастворимыми витаминами

23. введение новой пищи постепенно заменяющей кормление грудью это:

- а. докорм б. прикорм
в. искусственное вскармливание г. смешанное вскармливание

24. цель введения прикорма:

- а. удовлетворение возросших потребностей в пищевых веществах
б. обеспечение потребности в жирах
в. обеспечение потребности в углеводах
г. обеспечение потребности в поваренной соли

25. первым прикормом для ребенка грудного возраста является:

- а. фруктовый сок б. овощное пюре
в. мясной фарш г. кефир

26. первый прикорм вводят ребенку в возрасте (мес.):

- а. 2,5-3 б. 3,5-4 в. 4,5-5 г. 5,5-6

27. вторым прикормом для ребенка грудного возраста является:

- а. фруктовый сок б. овощное пюре с мясным фаршем
в. молочная каша г. кефир

28. второй прикорм вводят ребенку в возрасте (мес.):

- а. 4 мес. б. 5 мес. в. 6 мес. г. 7 мес.

29. блюда из мяса вводят в рацион ребенка в возрасте (мес.):

- а. 7 мес. б. 8 мес. в. 6,5-7мес. г. 7,5-8 мес.

30. третий прикорм вводят ребенку в возрасте (мес.):

- а. 4,5-5 б. 5,5-6 в. 6,5-7 г. 7,5-8

31. третьим прикормом для ребенка грудного возраста является:

- а. фруктовый сок б. овощное пюре
в. молочная каша г. кефир

32. ребенка рекомендуется отнимать от груди:

- а. в жаркий период года б. в холодный период года

в. при заболеваниях г. при контакте с инфекционными больными

33. при искусственном вскармливании в качестве заменителей женского молока используют:

- а. фруктовые соки б. овощное пюре
в. фруктовое пюре г. молочные смеси

34. клинический признак, возникающий у грудного ребенка при недостаточном поступлении пищевых веществ:

- а. малая прибавка массы тела
- б. частое мочеиспускание
- в. обильный стул
- г. лихорадка

35. факторы, способствующие созданию разряженного пространства в полости рта ребенка облегчающие сосание:

- а. комочки Биша, большой язык
- б. комочки Биша, маленький язык
- в. обильное слюнотечение, большой язык
- г. обильное слюнотечение, маленький язык

36. ёмкость желудка у новорожденного составляет (в мл.):

- а. 30-35
- б. 50-55
- в. 100-150
- г. 250-300

37. ёмкость желудка у ребенка 1 года жизни:

- а. 30-35
- б. 50-55
- в. 100-150
- г. 250-300

38. склонность детей к срыгиванию обусловлена:

- а. слабым развитием кардиального сфинктера
- б. хорошим развитием кардиального сфинктера
- в. слабым развитием пилорического сфинктера
- г. хорошим развитием пилорического сфинктера

39. при естественном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают:

- а. бифидобактерии
- б. кишечная палочка
- в. лактобактерии
- г. энтерококки

40. при искусственном вскармливании в кишечнике ребенка преобладают:

- а. бифидобактерии, лактобактерии
- б. кишечная палочка, энтерококки
- в. стафилаккоки, пневмококки
- г. протей, синегнойная палочка

41. при геполактации женщине рекомендуют:

- а. ограничение жидкости
- б. ограничение белков
- в. прием жидкости за 20 мин. до кормления
- г. прием пряностей за 20 мин. до кормления

42. показание для перевода ребенка на искусственное вскармливание:

- а. самопроизвольное истечение молока
- б. отсутствие молока
- в. затруднение выделения молока
- г. быстрое поступление молока

43. показание для докорма ребенка:

- а. гипогалактия
- б. паратрофия
- в. срыгивание
- г. дисфагия

44. при искусственном вскармливании ребенка используется адаптированная сладкая молочная смесь:

- а. «Бона»
- б. Нарине
- в. 2/3 коровье молоко (см. №3)
- г. цельный кефир

45. при искусственном вскармливании ребенка используется адаптированная кисло молочная смесь:

- а. цельный кефир
- б. бифилакт
- в. «Детолакт»
- г. «Симила克»

46. прикорм начинают давать ребенку:

- а. перед кормлением грудью
- б. после кормления грудью
- в. полностью заменяя одно кормление грудью
- г. между кормлениями грудью

47. цель введения ребенку докорма - обеспечивать:

- а. недостающие кол-во питательных вещ-в
- б. увеличить поступление поваренной соли
- в. уменьшить поступление поваренной соли
- г. увеличить поступление жиров

48. при трещинах на сосках у матери:

- а. не прекращать кормление грудью
- б. прекратить кормление грудью
- в. исправить положение при кормлении

49. критерии перевода недоношенного новорожденного с зондового кормления на кормление из бутылочки:

- а. появление сосательного рефлекса
- б. прибавка массы тела
- в. увеличение комочеков Биша
- г. исчезновение физиологическое диспесии

50. идеальной пищей для недоношенных детей является:

- а. «Бона» б. «Нарине» в. цельный кефир г. грудное молоко