Приложение к теме № 12 КТП

Выберите правильный ответ:

1. Срочными называются роды:
А. до 28 н.г
Б. на 28-37
В. На 38-40 нед.
Г. 41-42 нед.

2. При проведении первого дородового патронажа сестра должна
А. Обучить беременную уходу за новорожденным
Б. Выявить из анамнеза факторы риска
В. Обучить беременную поведению в родах
Г. Все перечисленное верно

3. Здоровье новорожденного зависит от
А. Наследственности
Б. Течении беременности и родов
В. Условий окружающей среды и вскармливания новорожденного
Г. Все перечисленное верно

4. Клинический признак шкалы Апгар
А. Температура тела
Б. Цвет кожных покровов
В. Длина новорожденного
Г. Масса тела новорожденного

5. Абсолютный критерий доношенности
А. Громкий крик
Б. Розовые кожные покровы
В. Плотные кости черепа
Г. Морфологическая и функциональная зрелость, срок гестации 38 недель

6. Клинические признаки полового криза
А. Гиперимия кожи
Б. Снижение массы тела
В. Нагрубание молочных желез, кровянистые выделения из влагалища
Г. Повышение температуры тела до 38 градусов.

7. При проведении патронажа к новорожденному медицинская сестра обязана:
А. Осмотреть ребенка
Б. Провести беседу по уходу за новорожденным
В. Обучить мать пеленанию и купанию ребенка
Г. Все верно

8. Первый патронаж новорожденного осуществляют:

А. участковый врач
Б. участковая сестра
В. Акушерка женской консультации
Г. Участковый врач совместно с медсестрой

9. Оценка по шкале АПГАР применяется для:
А. Оценки физического развития
Б. Оценки функционального сосотояния и адаптационных реакций новорожденного
В. Оценки психомоторного развития

10. К транзиторным переходным состояниям новорожденного относится:
А. Физиологическая желтуха
Б. Резкое беспокойство
В. Синюшность носогубного треугольника
Г. Потеря массы тела после рождения более 10 %

11.В норме большой родничок закрывается в возрасте
А. 3 месяца Б. 9 месяцев В. 11 месяцев Г. 12-15 месяцев

12.Центильные таблицы применяются для оценки:
А. Соматипа ребенка

Б. Психо-моторного развития

В. функционального развития ребенка

13. Выберите правильный ответ
Комплекс «оживления» появляется в возрасте
А.1 месяца г. 5 мес.

Б. 2-х мес. д. 6 мес.

14.В. 3-х мес. Ребенок ест с ложки густую пищу и начинает пить из чашки
А. 3 мес. г. 10 мес.

Б. 6 мес. д. 12 мес.

В. 8 мес.

15.Кратность патронажей м/с к ребенку на первом полугодии:
А. один раз в неделю

Б. Один раз в 2 недели

В один раз в 10 дней

Г. один раз в месяц

16.Количество дыханий за1 минуту у ребёнка 1-ого года жизни :

А. 10-20.

Б. 35-40

В. 30-25.

Г. 40-60.

17. К АФО особенностям органов дыхания у детей относятся:

А. верхние дыхательные пути узкие, короткие.

Б. слизистая оболочка богата капилярами.

В. мала жизненая ёмкость лёгких.

Г. всё перечисленное верно.

18.На естественном вскармливании в кишечнике ребёнка преоблодают:

А. кишечные палочки.

Б. бифидум бактерии.

В. энтероккоки.

Г. стафилоккоки.

19.Средний рост ребёнка в год:

А. 65 см. Г. 80 г.

Б. 70 см.

В. 75 см.

20. Ребёнок ежемесечно в первые 6 месяцев жизни прибывает в массе:

А. 300 г. Г. 800 г.

Б. 400 г. Д. 500 г.

В. 600 г.

21.Выбери правильный ответ.

Ребёнок хорошо ползает:

А. 4 мес. Г. 7 мес.

Б. 5 мес. Д. 9 мес.

В. 6 мес.

22.Ёмкость желудка:

Возраст.	Обьём желудка.
А. 1 месяц.	1. 30-50 мл. 3. 150 мл.

Б. 3 месяца. 2. 100 мл. 4. 200 мл.

23. С целью профелактики анемии у детей первого года жизни необходимо:

А. осуществлять контроль за анализом крови у беременной женщины.

Б. Осуществлять контроль за анализом крови всем здоровым детям достигших 3х месячного возраста.

В. рационально вскармливать детей.

Г. всё перечисленное верно.

24.Среднегодовая прибавка в массе ребенка старше 1 года равна:
а) 2 кг

б) 5 кг

в) 1 кг

г) 800 г

25.Масса ребенка старше 1 года определяется по формуле:
а) 75 + 5 * n

б) 10 + 2 * n

в) вес Н + 800 * 6 + 400 * (n –6)

г) 3 * n + последняя цифра возраста

26.Прорезывание молочных зубов заканчивается:
а) в 12 месяцев

б) в 18 месяцев

в) в 24 месяца

г) в 3 года

27.Ревакцинация АКДС проводится:
а) в 1 год

б) через 12-18 месяцев после законченной вакцинации

в) в 5 лет

г) в 7 лет

28.Какой показатель используют для оценки половой зрелости в пубертатном периоде у девочек:
А) толщина п\к жирового слоя

Б) окружность грудной клетки

В) степень развития молочных желез

Г) тембр голоса

29.Здоровые дети с нормальным физическим и НПР, не имеющие хронических патологий, относят
группе здоровья:
А) I

Б) II

В) III

Г) IV

30.Ревакцинация БЦЖ проводится в 7 и 14 лет:
А) при отрицательной пробе Манту

Б) при положительной пробе Манту

В) при сомнительной пробе Манту

Г) постановка необязательна

31. Первородящие ощущают шевеление плода с
А. 18 недель беременности
Б. 22 недели
В. 16 недель
Г. 20 недель

32.Анализ мочи у беременной проверяется
А. 3 раза за беременность
Б. 2 раза в неделю
В. К каждой явке
Г. 1 раз в месяц

33. Гериатрия это
А. Наука о заболеваниях, вызванных медработниками
Б. Наука о психических заболеваниях
В. Наука о лечении травм
Г. Наука о старческих заболеваниях и их лечении

34 Причиной остеопороза является
А. дефицит жиров
Б. Избыток кальция
В. Избыток магния
Г. Дефицит кальция

35.Старческий возраст это
А. 75-90 лет
Б. 50-60 лет
В. 45-59 лет
. 60-75 лет