

Задания в тестовой форме по теме «Период новорожденности». Выберите один правильный ответ.

1. Назовите гестационный возраст доношенного новорожденного:

- A. 12 недель
- B. 28 недель
- C. 28-37 недель
- D. 38-40 недель

2. Срочными называют роды:

- A. до 28 недель
- B. на 28-37
- C. на 38-40
- D. 41-42 нед.

3. Здоровье новорожденного зависит от :

- A. Наследственности
- B. Течение беременности и родов
- C. Условий окружающей среды и вскармливания новорожденного
- D. Все перечисленное верно

4. Первый патронаж медсестры проводиться на:

- A. на 5-6 недели гестации
- B. на 15-16 недели гестации
- C. на 30-32
- D. Не позднее 10 дней после постановки на учет в женскую консультацию

5. При проведении первого дородового патронажа сестра должна:

- A. Обучить беременную уходу за новорожденным
- B. Выявить из анамнеза факторы риска
- C. Обучить беременную поведению в родах
- D. Все верно

6. При проведении второго патронажа сестра должна

- A. Подготовить беременную к родам
- B. Провести беседу по подготовке жилья к встрече новорожденного
- C. Обучить беременную правилам ухода за новорожденным
- D. Все верно

7. Причиной приведшей к внутриутробному инфицированию плода может быть:

- A. Возраст родителей старше 30 лет

- B. Профессиональные вредности
- C. Экстрагенетическая патология беременной
- D. Вредные привычки родителей

8. Факторами риска по рождению детей с нарушениями ЦНС может быть:

- A. Возраст родителей
- B. Нарушение питания и режима беременной
- C. Прием антибиотиков
- D. Вредные привычки беременной

9. Бесконечный прием лекарств беременной может привести к:

- A. ВУИ
- B. Угрозе выкидыша
- C. Патологии в родах

10. Клиническим признаком шкалы АПГАР является

- A. Масса тела
- B. Рост
- C. Толщина подкожно жирового слоя
- D. Частота сердцебиения

11. Оценка по шкале АПГАР применяется для

- A. Оценка физического развития
- B. Оценка функционального состояния и адаптационных реакций новорожденного
- C. Оценка психомоторного развития

12. Клинический признак шкалы Апгар

- A. Температура тела
- B. Цвет кожных покровов
- C. Длинна
- D. Вес

13. Абсолютный критерий доношенности:

- A. Громкий крик
- B. Розовые кожные покровы
- C. Плотные кости черепа
- D. Морфологическое и функциональная зрелость, срок гестации 38 недель

14. Выписка здорового ребенка из роддома возможна если:

- A. Ребенок восстановил массу после рождения
- B. Зажила пупочная ранка
- C. Проведена вакцинация БЦЖ
- D. Имеется достаточное количество молока у матери

15. К транзиторным переходным состояниям новорожденного относиться:

- A. Физиологическая желтуха
- B. Резкое беспокойство
- C. Синюшность носогубного треугольника
- D. Потеря массы тела после рождения на 10%

16. Причиной транзиторной желтухи новорожденных является:

- A. Недостаточная лактация у матери
- B. Гемолиз эритроцитов, незрелость функций печени
- C. Переход эстрогенов от метрии плоду
- D. Перегревание плода

17. Половой криз у новорожденных характеризуется и вызван:

- A. Нагрубанием грудных желез
- B. Кровянистыми выделениями из влагалища у девочек
- C. Отеками мошонки у мальчиков
- D. Все верно

18. Клинические признаки полового криза

- A. Гиперемия кожи
- B. снижение массы тела
- C. Нагрубания молочных желез, кровянистые выделения из влагалища
- D. Повышение температуры до 38 градусов

19. Физиологическая убыль массы появляется, составляет и сохраняется:

- A. Сразу после родов, не более 3% проходит к третьему дню жизни
- B. В первые 3-4 дня после родов, не более 10%, восстанавливается к 7 дню жизни
- C. В первые дни после родов
- D. Восстанавливается ко 2-3 недели жизни

20. Первый патронаж новорожденного осуществляется:

- A. Участковый врач
- B. Участковая сестра
- C. Акушерка женской консультации
- D. Участковый врач вместе с сестрой

21. При проведении патронажа к новорожденному сестра обязана:

- A. осмотреть ребенка
- B. провести беседу по уходу за ребенком
- C. Обучить мать пеленанию и купанию ребенка
- D. Все верно

22. Вакцина БЦЖ вводиться новорожденному с целью:

- A. Профилактики туберкулеза
- B. Здоровым новорожденным
- C. Строго внутрикожно в верхнюю третью плеча
- D. Все верно

23. Новорожденного ребенка не рекомендуется тупо пеленать потому, что:

- A. Дыхательные пути короткие и узкие
- B. Слизистая нежная и легко набухает
- C. В легких слабо развита эластическая ткань, имеется склонность к ателектазам*
- D. Большая часть состоит из хрящевой ткани, позвоночник не имеет изгибов

24. При уходе за новорожденным необходимо следить за проходимостью носовых входов, потому что:

- A. Дыхательные пути узкие и короткие, слизистая легко набухает
- B. Придаточные пазухи носа развиты слабо
- C. Легко отличаются слабым развитием эластической ткани, склонны к ателектазам

25. При проведении ежедневного туалета новорожденного необходимо (все верно, кроме одного)

А. Подмыть ребенка, обработать естественные складки

Б. Обработать пупочную рану

В. Провести профилактику гонобленоре

Г. Провести туалет глаз, лица

26. При купании новорожденного необходимо (все верно, кроме одного)

А. Погрузить ребенка в воду до подбородка

Б. Обливать чистой водой из кувшина в конце купания, $t=37$

В. Погрузить ребенка в воду до сосковой области

Г. Использовать кипяченую воду до заживления пупочной раны

27. АФО кожи новорожденного:

А. Тонкий роговой слой, богатая капиллярная сеть

Б. Хорошо развиты и функционируют сальные железы

В. Слабо развиты потовые железы

Г. Все верно

28. Частая смена пеленок необходима потому, что

А. Кожа и нежная

Б. снижен местный иммунитет

В. Частота мочеиспусканий 20-22 раза в сутки

Г. Все верно

29. АФО костно-мышечной системы новорожденных является

А. Большая часть состоит из хрящевой ткани, позвоночник не имеет изгибов

Б. В костной ткани большее содержание воды, меньше твердых в-в, возможны деформации

В. Богатство кровеносных сосудов

Г. Все верно

30. АФО органов кровообращения новорожденного (все верно, кроме одного)

А. Плацентарное кровообращение

Б. Открыт боталов проток

В. наличие аранциева протока

Г. Наличие овального отверстия

31. АФО мочевыделительной системы у новорожденных

А. Малая емкость мочевого пузыря

Б. Короткий мочеиспускателльный канал, легкая ранимость слизистых

В. Частота мочеиспускания 20-22 р.в сутки

Г. Все верно

32. Выберите данные соответствия окружности головы и грудной клетки доношенного новорожденного:

А. Окружности равны

Б. Окружность головы больше груди на 2 см.

В. Окружность головы на 3-4 см больше груди