Лекция №3 Ур Эт-30
416-425

Тема:
Нервная ткань - это ткань специализированного назначения:

(Нейральная ткань)

Нервная ткань — основа нервной системы.

Нервная система - это совокупность специализированных структур, обеспечивающая и координирующая деятельность всех органов и систем орг-ма в постоянном взаимодействии с внешней средой.

Нервная (или нейральная) ткань представлена (состоит из) 1) собственно нервной тканью (нервные клетки - нейроциты (или нейроны).

2) нейроглия - представлена клетками вспомогательных функций (или клетками глии).

Нервная ткань состоит из:
- тела с ядром
- особых отростков
- несколько коротких

Нервные клетки - это клетки возбудимой ткани — они обладают:
- раздражимостью,
- лабильностью
- защитой (обладают свойством регенерации)
- секреторная (вырабатывают медиаторы)
- регенераторная (восстановительная, обновление)

11 – проводят импульсы к телу нейрона

– одного длинного отходящего от тела отростка – аксона, который проводит импульсы от тела нейрона к другому нейрону или тканям рабочих органов.

По количеству отростков нейроны классифицируются на:

– мультиполярные – много отростков
– биполярные – два отростка
– псевдоуниполярные,
– униполярные – один отросток.

Нервные клетки способны:

– воспринимать раздражения из внешней или внутренней среды
– трансформировать (преобразовывать) энергию раздражения в нервный импульс
– проводить нервный импульс
– анализировать и интегрировать эти импульсы

P.S. В этом определяется специфическая ф-ция н.с.

Контакты между нейронами или между нейроном и рабочим органом осуществляются с помощью синапсов

Межнейронный синапс – между аксоном одного нейрона и дендритом или телом другого.

Нервная ткань

Нейрон:

- Тело
- Аксон
- Дендрит

Синапс – контакт между нейронами или между нейроном и рабочим органом.

Межнейронный синапс – между аксоном одного нейрона и дендритом или телом другого.

Строение синапса



Окончание нейрона расширено и заполнено пузырьками с нейромедиатором.

Нейромедиаторы – вещества, вырабатываемые самим нейроном.

Основные нейромедиаторы:

- *В переферической нервной системе*
  - ацетилхолин
  - норадреналин
- *В ЦНС*
  - дофамин
  - серотонин
  - эндорфин

рецептор→чувствительный нейрон→синапс→двигательный нейрон

Синапс между нейроном и органом



Для взаимодействия с нейромедиатором в мембране клетки имеются специальные белки – рецепторы.

Различают:

- Холинорецепторы – взаимодействуют с ацетилхолином
- Адренорецепторы – взаимодействуют с норадреналином
    - α-адренорецепторы – очень чувствительны, реагируют на небольшие количества норадреналина
    - β-адренорецепторы – менее чувствительны

Примеры:

- Ацетилхолин – выделяется нервными окончаниями вегетативных парасимпатических нервов, при взаимодействии с холинорецепторами сердца, замедляет его работу.
- Норадреналин – выделяемый нервными окончаниями вегетативных симпатических нервов, при взаимодействии с адренорецепторами сердца, увеличивают частоту его сокращений.

Таблица № 11.

СХЕМА НЕРВНО- МЫШЕЧНОГО СИНАПСА .



1 - нервное волокно,
2 - нервное окончание с пузырьками медиатора,
3 - постсинаптическая мембрана,
4 - синаптическая щель,
5 - мембрана мышечного волокна,
6 - пресинаптическая мембрана /покрывает нервные окончания/.

СИНАПС состоит из : 1. пресинаптической мембраны,
2. синаптической щели,
3. постсинаптической мембраны.

Таблица №1.

Схема работы нервно-мышечного синапса.

НЕРВНЫЙ ИМПУЛЬС/достигает нервного окончания/

↓

ДЕПОЛЯРИЗАЦИЯ пресинаптической мембраны

↓

Разрыв пузырьков и выброс АХ в синаптическую щель

↓

АХ оседает на постсинаптической мембране

↓

повышается проницаемость постсинаптической мембраны для Na^+, K^+

↓

Na^+ и K^+ уходят внутрь мышечного волокна и постсинаптическая мембрана становится электроотрицательной.

↓

т.к. соседние с ней участки мышечного волокна заряжены положительно, то между разноименно заряженными участками протекает МЕСТНЫЙ ТОК/происходит передача нервного импульса по всему мышечному волокну/.

↓

АХ разрушается на постсинаптической мембране ферментом холинэстеразой.

↓

Постсинаптическая мембрана приобретает исходный заряд.

Химические вещества, способные блокировать холинорецепторы- Флаксидол, Листенон , - используются в хирургии [redacted]

5

Н. клетки подразделены на три группы.

1. Чувствительные или рецепторные:
   - они имеют специализированное окончание-рецептор.

Рецептор способен воспринимать раздражение внешней или внутренней среды. Такими клетками являются биполярные или псевдоуниполярные нейроны. Р.S. Псевдоуниполярные Н. клетки воспринимают: - боль;
- температуру t°;
- прикосновение (тактильное раздражение)
- степень сокращения или расслабления мышц.

Такие ощущения называются общей чувствительностью.

Биполярные Н. клетки -

- это клетки специализированной чувствительности. Они воспринимают раздражения:
  - слуховые
  - обонятельные
  - вкусовые
  - слуховые
  - вестибулярные

2. Вставочные, или ассоциативные нейроны. Они обеспечивают:
   - анализ и синтез поступающей информации
   - передачу информации на эффекторные клетки.

Обычно вставочными нейронами являются мультиполярные клетки.

3) эффекторные нервные клетки имеют:

- специализированное окончание, передающее н. импульс на рабочий орган: мышцу или железу. Называется такое окончание — эффектор
- В качестве эффекторных клеток выступают нервные клетки периферических нервов.

Нервные волокна или нервы:

- это отростки нервных клеток
- эти отростки осуществляют проведение нервных импульсов
- ~~разумеется 2-а вида нервных~~ волокон: а) мякотные (миелиновые) Миелин придаёт им белый цвет. Волокна имеют толстую защитную оболочку, (кабель имеет резиновую оболочку) Оболочка не даёт возбуждению "расплываться" на соседние.

Мякотные волокна преимущественно двигательные (передают тактильную и т° чувствительность) Более толстые из них проводят болевую чувствительность.

б) Безмякотные волокна (безмиелиновые) —

- это эффферентные волокна вегетативной н. системы
- они обеспечивают иннервацию внутренних органов, желёз и сосудов.

по направлению к периферии
Нервного нервов разделяют
две группы волокон

1. центростремительные - функционально являются афферентными (восходящие, идут к спинному или головному мозгу (чувствительные)

2. центробежные волокна - идут от головного и спинного мозга к рабочим органам (мышцы, сосуды, железы) Называются эти волокна эфферентными. З. Смешанные и.б.ч.

P.S. - Скопление нервных волокон составляют белое вещество спинного и головного мозга
Скопление клеток (нейронов) составляют серое вещество
Белое, по функциям проводящие
серое, по функциям регулирующее
Основной формой деятельности (работы) н. системы является рефлекс.
(ответная реакция ор-ма на раздражение с середины XVIII в.

Зач! #

а путь — рефлекторный дуги!)

Путь И. рефлекторной дуги включает в себя 5 (пять) звеньев:

I-е звено:
— чувствительный рецептор (н. окончание, воспринимающее раздражение и трансформирующее его в н. импульс)

II-е звено — афферентный путь (восходящий, чувствительный к спинному и головному мозгу)

III-е звено — центр (спинной и головной мозг — серое в-во)

IV-е звено — эфферентный путь (двигательный, нисходящий от головного и спинного мозга — передний)

V-е звено — рабочий орган (мышцы, сосуды, железы и т.)

Мы познакомились с одной из 4-х тканей – нервная. Это была "Последняя бой, он трудная самая". Н. ткань нейрон называют "Её величество Н. ткань". Из неё построена сложная и высшая мозг – н. ткань в виде белого и серого вещества.

Для дальнейшей работы, для дальнейшего изучения нам необходимы не только общие понятия, но и конкретные знания о т. г. необходимо знание классификации н. системы. Принято 2-е основные классификации:

1) анатомическая (по структурному строению)

2) физиологическая (по функции, по способу работы)

1. Анатомическая классификация:



P.S.

Нервы – (скопление отростков Н. клеток (нервные волокна)) → это ткани Н. ткани

цвет: синий, желтый, зеленый

Нервные узлы, ганглии, – это скопления нейронов (тел) вне центральной н.с.

Нервные окончания:

- рецепторные – конечные образования дендритов в органах; воспринимают раздражение и преобразуют их в н. импульс.
- эффекторные – конечные образования аксонов в рабочих органах: мышцах, железах.

Нервный импульс – электрический сигнал, распространяющийся по клеточным мембранам.

1. **Функциональное деление нервной системы**

Соматическая

– подчинена воле человека, регулирует работу скелетных мышц.

Двигательные центры находятся в коре г. мозга.

Автономная (вегетативная)

Не подчинена воле человека, регулирует работу внутренних органов, кожи, кровеносных сосудов и сердца.

Вегетативные центры находятся в гипоталамусе

Симпатическая

Включается во время интенсивной работы, требующей затраты энергии.

Тела первых нейронов лежат в грудном отделе и в поясничном отделе спинного мозга.

Парасимпатическая

Способствует восстановлению запасов энергии во время сна и отдыха.

Тела первых нейронов лежат в среднем, продолговатом и в крестцовой части спинного мозга.

2. Путь нервного импульса 2-ух нейронной.

...ися основными, и дополнительными подробностями / Тема Н. ткань / Н. ткань.

1. Длина аксона от 1мм до 10 и 1м. От него под углом отходят тонкие веточки. Движение по нему ш.б 1-3мм в сут – медленный ток
2. Н. клеток без отростков нет. ш.б скорость 5-10мм в час – быстрый ток.
3. Псевдоуниполярные клетки называются, т.к. от каждой один отросток, который делится на дендрит и аксон.
4. Н. клетки не делятся митозом, потому о них говорят, что не восстанавливаются. Их необходимо беречь. Такой „няней" явл. нейроглия – тканевое ее-во Н. ткани
5. В состав нейронов входят ядро и органоиды клетки (макроэргические) – это энергоносители, остальные, олигодендроциты.
6. „Одежда" из миелина для аксонов – это миелиновая „Изоляция" третьего, 2/3 равные перехваты – перехваты Ранвье.
7. Функция или электрофизиология Н. волокна – самое сложное понятие. Это понятие механизма возникновения Н. импульса. При установке микроэлектродов – одного на мембрану клетки, другой в тело нейрона, прибор покажет -70мв + положительного снаружи и – отрицательный внутри. Н разность потенциалов (зарядов) в 2-ух точках эл. поля или цепи называется потенциалом, поэтому разность зарядов называем потенциалом покоя.

Что же создаёт её?

Мембрана Клеток плохо проницаема для ионов Na, Ca, Cl и др.) кроме ионов „К" содержится только внутри у нейрона, а ионов Na больше снаружи нейрона.

„К" выходит из клетки, не уравновешивается внеклеточный заряд, т.к мембрана для него проходима,

тельной зоны сердца и остановился — ткани и органические вещества продолжают жить. Прекращается работа мышцы, она то и создает разность зарядов или потенциал покоя. Сердце перестает сокращаться (является) полярным.

При стимулирующем раздражении (трение, удар тока и т.д.) в месте его — и — или — и —, начинается 2-ая стадийная перестройка → ионы „Na" устремляются в клетку, тем самым происходит накопление (+) т.е. происходит деполяризация (де - прекращение, удаление, устранение — деполяризация, деполяризация) — это снятие потенциала покоя, вплоть до исчезновения — (быстро внутри заряд становится (+) по сравнению с наружным) и „K" на такое „действие" „Na" лавинообразно поступает устраняя клетки во внеклеточное пространство т.е снаружи (+) заряд возвращая прежнюю расстановку эл.кар. дна т.е происходит реполяризация мембраны (ре - восстановление, повторение, реконструкция, реполяризация) Сразу же К. „Na" после, выключается „Na" из клетки, а „K" в стадии обратно, восстанавливается поляризация и потенциал покоя.

Пока этот процесс идёт клетка невосприимчива, к др. стимулирующим — это рефрактерный период. Всё происходит в нервном волокне, при нанесении стимула, но возбуждение-реполяризация начинается по мембране всего волокна и нервный импульс потенциал действия. Достигает М. окончания и передаётся на мышцу или следующий нейрон. По иннервированному волокну по-(нервная) распространяется скорость т.е быстро-120 м/сек а по голому 1-2 м/сек.

М. окончание с нейроном на нейрон и др. структуру передаётся с помощью синапса (А. Хилл) Хим.

8. Рецепторы или М. окончания, которые воспринимают раздражения, чувствительные, афферентные, расположены во всех внутренних органах, сосудах, кожах, мышцах

I-вой потенциал действия (действия), передающийся по цепи н. клеток до эффекторного нейрона, а затем на исполнительный орган (эффектор).

Вывод:

1. Потенциал покоя (или мембранный потенциал) – разность потенциалов между наружной поверхностью клетки и её внутренним содержимым (цитоплазмой). Поверхность заряжается (+) по отношению к содержимому (-).

Определяется потенциал покоя с помощью внутриклеточного микроэлектрода.

2. Потенциал действия возникает при пересечении на участке н. или мышечного волокна раздражителя, возникает возбуждение (быстрое колебание мембранного потенциала). Участок возбуждения заряжается (–) электроотрицательно по отношению к невозбуждённому – волна возбуждения с/з секрет далеше → на др. н. клетку или орган.

3. Ионная теория основывается (на движении ионов Na; K) – дана из причин возникновения потенциала покоя.

4). При потенциале действия происходит деполяризация – приведет раздражение и реполяризация (инактивация Na) – снижается Na-вая проницаемость, ионы Na из цитоплазмы. Клетка в окружающую среду.

Значение нервной системы

1. Обеспечивает согласованную работу всех органов и систем организма.

2. Осуществляет ориентацию организма во внешней среде и приспособительные реакции на её изменения.

3. Составляет материальную основу психической деятельности:
   - речь
   - мышление
   - сознание поведение.

Таблица № 10

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТКАНЬ - НЕРВНАЯ .

Нервная ткань - основа нервной системы.

Состав нервной ткани :

1. НЕЙРОНЫ- нервные клетки. Способны под действием раздражителя приходить в состояние возбуждения, вырабатывать нервные импульсы и передавать их. /Это и определяет специфическую функцию нервной системы/.

2. НЕЙРОГЛИЯ - клетки, выполняющие функцию межклеточного вещества : разграничительная,
- опоры,
- защиты /обладают свойствами фагоцитоза/,
- секреторная /вырабатывают медиаторы/
- регенераторная.

Нейрон имеет отростки :

1/аксон /всегда один/ - проводит импульсы от тела нейрона к другому нейрону или тканям рабочих органов .

2/дендриты -проводят импульсы к телу нейрона.

Классификация нейронов:/по количеству отростков /

- мультиполярные - много отростков,
- биполярные - два отростка,
- псевдоуниполярные.,
- униполярные - один отросток.

Нервная система представлена :

1/ серым веществом - состоит из тел нейронов,

2/ белым веществом - состоит из отростков нейронов.